



נספח ד'

תכשירי הדברה מורשים לשימוש בעגבניות לתעשייה: עונת 2024

מהדורה 21

תאריך עדכון: 19.2.24

- ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בעגבניות תעשייה במדינת ישראל, הרשימה אינה מהווה המלצה להשתמש בתכשירים הנ"ל.
- השימוש בתכשירי ההדברה כפוף לרשום בתווית המצורפת לאריזתם, חלה חובה על המגדל לפעול בהתאם לתקנות התווית - תקנות הגנת הצומח (קיום הוראת תווית האריזה), התשל"ז-1977, בכל מקרה של אי התאמה בין הרשום ברשימה זו לבין תווית הרישוי יש להתייחס לרשום בתווית.
- השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות ונדרשת התאמה של ימי ההמתנה של תכשירים אלו בשימוש בתוצרת המיועדת ליצוא. התאמת ימי ההמתנה של תכשירים אלו תהיה על אחריותו של היצואן.
- תכשירים המאושרים גם לחקלאות אורגנית מסומנים בירוק.
- כאשר מצויין בתווית תכשיר מינון בכמות לדונם או בריכוז, יש להשתמש בכמות לדונם בנפחי ריסוס נמוכים, ובריכוז בנפחי ריסוס שמעל 100 ליטר לדונם.

<https://pesticides.moag.gov.il/#/pages/tachshirim> :מידע נוסף על התכשירים ניתן לקבל באתר משרד החקלאות – השרותים להגנת הצומח

בעמודות השאריות: * = גבול כימות מכשירי המעבדה, D = ברירת מחדל, פטור = אין מגבלה לגבי שאריות מותרות
רקע ירוק = השארית זהה או גבוהה מזו של ישראל, רקע אדום = השארית נמוכה מזו של ישראל, רקע צהוב = אחר.

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
אגרוטיס Agrotis sp.											
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה		3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1								ספסן 515 פ"ג
	0.01D	0.01D	פטור			3	1.5 - 2 ק"ג	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 1015 פ"ג
							1-1.5 ק"ג				קורגן ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05			3	15 סמ"ק	גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	
אקרית אדומה מצויה Tetranychus urticae											
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	מינון מדוייק, ראה בתווית. בשילוב עם שמן מינרלי או עם משטח.	3	50-60 סמ"ק	6	ABAMECTIN	6	אגרירון ת"מ
											אינורט ת"ש
											אקטינמור ת"מ
											אקרימקטין ת"מ
											ביומקטין ת"מ
											בקטין ת"מ
											ורטיגו ת"מ
											ורטימק ת"מ
											ורמוט ת"מ
ורקוטל ת"מ											
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב	ניתן לשלב עם ביסקיה	3	60 סמ"ק	23	SPIROMESIFEN	23	אוברון ת"ר
							60-100 סמ"ק				אובליסק תש"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור		בשילוב מילבנוק	3	1%	אדמה מכתשים	לא ידוע	MINERAL OIL	E.O.S שמן
פטור			פטור			3	1%	אדמה אגן	לא נקבע	SUCROGLYCERIDES	אנדיבאג ת"מ
	0.3	0.3	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	40 סמ"ק	אדמה מכתשים	10A	CLOFENTEZINE	אפולו 50 ת"ר
			פטור			3	0.07%	תפזול	לא נקבע	MODIFIED POLYALKYLENEOXIDE HEPTAMETHYLTRISILOXANE	אקו-טק ת"נ
						3	0.08%	אדמה אגן			מייטוואט ת"נ
0.7	0.2	0.3	0.7	א. אירופי, אנגליה		3	150 סמ"ק	רימי	20B	ACEQUINOCYL	אקסמייט ת"ר
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	לא יותר מ 2 רסוסים עוקבים	7	75 סמ"ק	12A	DIAFENTHIURON	12A	בוננזה ת"ר
							100 - 150 סמ"ק				פניקס 500 ת"ר
											פגסוס 250 ת"ר
								תפזול			פניקס 250 ת"ר
4	0.5	0.5 (0.01 מ-8.2024)	0.05	א. אירופי מ- 8.2024 (מועד משוער)		3	50 סמ"ק	20B	BIFENAZATE	20B	דורמייט תש"מ
											פלוטו ת"ר
											פלורמייט ת"ר
											פרדיסו ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
המשך: אקרית אדומה מצויה <i>Tetranychus urticae</i>											
0.7	0.3	0.4	0.1			3	100 סמ"ק	אדמה אגן	25A	CYFLUMETOFEN	דפנדר ת"ר
0.2	0.07	0.01 0.07 (8.4.24 ת-נ)	0.02	א. אירופי מ- 8.4.24		3	25 סמ"ק	תפוזל אדמה אגן	10B	ETOXAZOLE	טופ-מייט ת"ר ספיידר ת"ר
0.3	0.5	0.05	0.1	א. אירופי, אנגליה		7	75 - 100 סמ"ק	אגריכס	C1	FENAZAQUIN	מגיסטר ת"ר
0.2	0.3	0.3	0.05			7	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	21A	FENPYROXIMATE	מטאור ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	500 סמ"ק	לוכסמבורג	לא ידוע	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	מטרונום פריים רקויאם פריים
	0.01D	0.01D	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	40 - 50 סמ"ק	רימי	21A	PYRIMIDIFEN	מייטקלין ת"ר
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב שמן אולטרא פיין 0.5%	3	100 סמ"ק	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ
	0.8	0.8	0.05	ארה"ב		7	75 גרם	כ.צ.ט	21A	TEBUFENPYRAD	מסאי-מייט א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	אגרימור אגרימור	לא ידוע	NEEM OIL	נגב ת"מ נים-בי ת"מ נימגארד שמן
	0.15	0.15	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	250 סמ"ק	גדות אגרו	21A	PYRIDABEN	נקסטר 10 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	לוכסמבורג	לא ידוע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	פליפר ת"ש
	פטור	פטור	פטור			3	3%	שלף	לא ידוע	PLANT OIL	תמר טק תח'
אקרית החלודה <i>Vasates lycopersici</i>											
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	בשילוב עם שמן מינרלי או עם משטח.	3	50 סמ"ק	כ.צ.ט עמיר שיוק תפוזל גדות אגרו תרסיס אדמה אגן גדות אגרו	6	ABAMECTIN	אגריון ת"מ אקרימקטין ת"מ ביומקטין ת"מ בקטין ת"מ ורטיגו ת"מ ורטימק ת"מ ורקוטל ת"מ
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב	ניתן לשלב עם ביסקיה	3	60 סמ"ק	לידור	23	SPIROMESIFEN	אוברון ת"ר
פטור	1	1	פטור		בשילוב שמן דימול 1%	3	30 - 60 סמ"ק	גדות אגרו	לא ידוע	AZADIRACTIN	איזידור ת"מ
2.5 (Mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 גרם	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול א"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפול מניעה במרווח 7-10 ימים	3	200 סמ"ק	אדמה אגן תפוזל	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	בראבו 720 ת"ר ברק ת"ר
	0.01D	0.01D	פטור פטור		בתוספת משטח אגוז 0.4%	3	1%	דע-קדם	לא ידוע לא ידוע	CANOLA OIL + NEEM OIL	גניקן ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Vasates lycopersici</i> אקרית החלודה המשך:											
פטור	פטור	פטור	פטור			3	4 - 3 ק"ג 400 גרם	אדמה מכתשים כ.צ.ט.	רב אתרי	SULFUR	גפריק 70 אב' קומולוס ג"ר תיוביט ג"ר
0.7	0.3	0.4	0.1		ניתן לשלב עם EOS במינון 1% עד 4 ריסוסים בעונה	3	100 סמ"ק	אדמה אגן	25A	CYFLUMETOFEN	דפנדר ת"ר
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג"ר
								לוכסמבורג			מנקוזן א"ר
								גדות אגרו			מנקוטל א"ר
								אגריכס			סנקוזב ג"ר
7	אגריכס	סנקוזב א"ר									
0.3	0.5	0.05	0.1	א. אירופי		7	75-100 סמ"ק	אגריכס	C1	FENAZAQUIN	מגיסטר ת"ר
	0.01D	0.01D	0.02	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	40 סמ"ק	רימי	21A	PYRIMIDIFEN	מייטקלין ת"ר
0.2	0.3	0.3	0.05			7	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	21A	FENPYROXIMATE	מטאור ת"ר
1	0.01*	0.01*	1	א. אירופי, אנגליה		3	150 - 200 סמ"ק	אדמה אגן	3A	FENPROPATHRIN	סמש ת"מ
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	100 - 150 סמ"ק	תפוזל	12A	DIAFENTHURON	פניקס 250 ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אדמה אגן תפוזל	6	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ
<i>Helicoverpa</i> spp. הליותיס (תנשמית)											
0.5	0.5	0.5 (0.01 מ- 14.8.2024)	0.2	א. אירופי מ- 14.8.2024	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.3	0.3	0.3	0.2		הליותיס עד 15 מ"מ	7	50 סמ"ק	תפוזל	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
								לוכסמבורג			טלסטאר ת"מ
								תרסיס			סטרטר ת"מ
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט.	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה		3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1								
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפוזל	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
2	2	0.6	0.5			14	40 סמ"ק	תרסיס	18 5	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	ארמדה ת"ר
0.4	0.5	0.06	0.01								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Helicoverpa spp.</i> (תנשמית) הליותיס המשך:											
0.2 (0.5-paste, 5-dry or wet pomace)	0.05	0.2	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	100 סמ"ק	לידור	3A	CYFLUTHRIN	באיטרואיד ת"מ
1	1	1.5	0.2			3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בו ת"מ
0.25 (0.8-paste)	0.2	0.2	0.02		עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05								
0.02 (0.15-paste)	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		3	100 סמ"ק	דור.קי	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דורנים ת"ש
	0.02	0.02	0.02				10 גרם	אדמה מכתשים			דנים פיט ג"ר
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	50 - 100 סמ"ק	גדות אגרו	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
0.6	0.2	2	0.3	אנגליה.		5	15 סמ"ק	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
2	2	0.6	0.5			7	75 סמ"ק	תפזול	18 6	METHOXYFENOZIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
0.4	0.5	0.06	0.01			3	50 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	150-100 גרם	אדמה מכתשים	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	פרוביט ג"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אגרולב	6	EMAMECTIN BENZOATE	פוקר ת"מ
								כ.צ.ט			פרוקיל 19.2 ת"מ
								אדמה אגן			פרוקליים ת"מ
								תפזול			פרפקט ת"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב.		14	200 סמ"ק	לידור	4A 3A	THIACLOPRID + DELTA METHRIN	פרותיאוס תש"מ
0.3	0.3	0.3	0.2	א. אירופי		4	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	3A 15	BIFENTHRIN + NOVALURON	רימון פאסט ת"ר
2	1	*0.01	0.1								
1.4	0.6	0.6	0.05		בשילוב ביו-פילם.	3	20 סמ"ק	גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר
								תרסיס			קורנס 200 ת"ר
<i>Tuta absoluta</i> טוטה אבסולוטה											
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.5	0.2			7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 6	ACETAMIPRID + EMAMECTIN BENZOATE	אוברטופ ת"פ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
0.5	0.5	0.5 (0.01 מ-14.8.2024)	0.2	א. אירופי מ-14.8.2024	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
המשך: טוטה אבסולוטה <i>Tuta absoluta</i>											
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה	בשילוב מטרונום פריים או EOS.	3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1								בז ת"מ
1	1	1.5	0.2			3	30 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	
0.25 (0.8-paste)	0.2	0.2	0.02		עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05			3	125 גרם	כ.צ.ט	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	דיפל DF ג"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
0.07	0.09	0.015	0.02	ארה"ב		3	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	6 28	ABAMECTIN + CHLORANTRANILIPROLE	ווליאם טרגו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי		3	40 סמ"ק	גדות אגרו	28	CYANTRANILIPROLE	ורמרק ת"ר
2	1	1	0.2		בהגמעה	3	25 גרם	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
0.6	0.2	2	0.3	אנגליה.		5	0.1%	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב שמן EOS במינון 1%	3	40 סמ"ק	אגריכס	6	EMAMECTIN BENZOATE	נוקאאוט ת"מ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01		לא יותר משני רסוסים עוקבים	7	אגרולב	פוקר ת"מ			
							כ.צ.ט	פרוקיל 19.2 ת"מ			
							אדמה אגן	פרוקליים ת"מ			
							תפזול	פרפקט ת"מ			
0.4	0.5	0.06	0.01			3	60 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
פטור	1	1	פטור		בשילוב תותח 0.5%	3	0.3%	דע-קדם	לא ידוע	AZADIRACTIN	עזגן א"ר
1.4	0.6	0.6	0.05		בשילוב ביו-פילם.	3	20 סמ"ק	גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר
								תרסיס			קורנס 200 ת"ר
2	1	*0.01	0.2	א. אירופי	בתוספת 1% EOS	4	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	0.5%	דע-קדם	לא ידוע	NEEM OIL + PYRETHRINS	תותח ת"מ
פטור	1	1	פטור						3A		
כנימה קמחית מנוקדת <i>Phenacoccus solenopsis</i>											
0.7 (1.2-puree, 2.6-paste)	0.3	0.3	0.1		בשילוב שטח 90 0.1%	7	0.03%	אגריכס	4C	SULFOXAFLOR	פלאש ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
כנימות עלה Aphids											
0.3	0.3	0.3	0.2			7	75 סמ"ק	תפוזל	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1 - 0.2%	רימי	לא ידוע	Beauveria bassiana	ביווריה ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור		בשילוב 0.1% משטח אגוז	3	0.8%	דע-קדם	לא נקבע	POTASSIUM SALT OF FATTY ACIDS	כנימת ת"נ
1	0.01*	0.01*	1	א. אירופי, אנגליה		3	200 - 350 סמ"ק	גדות אגרו	1A	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ
							50 - 75 גרם	גדות אגרו			לאנט 90 א"מ
8	0.02*	0.02*	3			3	200 סמ"ק	תרסיס	1B	MALATHION	מלתיון ת"מ
פטור	1	1	פטור		יש לרסס בשעות הערב	3	0.1%	אדמה מכתשים דע-קדם	לא ידוע	AZADIRACTIN	נימיקס 45 ת"מ עזגן א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	דע-קדם	לא ידוע	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ
פטור	1	1	פטור				0.4%	דע-קדם	3A		
1 (3-puree, 6-paste)	0.5	0.3	3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	היישום בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה, לא יותר משני טיפולים בעונה	3	40 סמ"ק	דור.קי	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"ר
								תפוזל			קודקוד ת"ר
								אדמה מכתשים			קוהינור 350 ת"ר
								לידור			קונפידור ת"ר
								תרסיס			קונפידנס ת"ר
	0.5	0.5	1	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	60 גרם	אדמה מכתשים	1A	PIRIMICARB	פירימור ג"ר
כנימת עש הטבק Bemisia tabaci											
0.45 (0.8-paste)	1	1	1	ארה"ב		3	60 - 120 סמ"ק	דור.קי	3A	SPIROMESIFEN	אובליסק תש"מ
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.5	0.2			7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 6	ACETAMIPRID + EMAMECTIN BENZOATE	אוברטופ ת"פ
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	70 - 100 גרם	גדות אגרו	14	THIOCYCLAM	אויסקט-S א"מ
0.7 (1-paste)	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה.		6	75 גרם	תפוזל	4A	DINOTEFURAN	אייקון ת"מ
						3		רימי			איפון ג"מ
								תרסיס			סומו תש"מ
2	0.01*	0.01*	0.3	א. אירופי, אנגליה	להדברת הזחלים	3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	16	BUPROFEZIN	אפלורד ת"ר
0.3	0.3	0.3	0.2			4	250 סמ"ק	אדמה אגן	3A 4A	BIFENTHRIN + ACETAMIPRID	אצטאסטאר ת"מ
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.5	0.2								
			פטור			3	0.07%	תפוזל	לא נקבע	POLYALKYLENEOXIDE MODIFIED HEPTAMETHYLTRISILOXAN	אקו-טק ת"נ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Bemisia tabaci</i> כנימת עש הטבק המשך:											
0.25 (0.8-paste)	0.2	0.2	0.02		בהגמעה.	3	60 סמ"ק	אדמה אגן	4A	THIAMETHOXAM	אקטרה ת"ר
	0.01D	0.01D	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	75 סמ"ק	תרסיס	12A	DIAFENTHIURON	בונזה ת"ר
								תפוזל			פניקס 500 ת"ר
								אדמה אגן			פגסוס 250 ת"ר
								תפוזל			פניקס 250 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1 - 0.2%	רימי	לא ידוע	<i>Beauveria bassiana</i>	ביווריה ת"ר
	0.5	0.5	0.05	ארה"ב.		3	80 סמ"ק	לידור	4A	THIACLOPRID	ביסקיה 240
								תפוזל			קלימרה ת"ר
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	50 - 100 סמ"ק	גדות אגרו	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
0.2 (0.5-dried)	0.15	0.01D	0.1	א. אירופי	עד 3 יישומים בעונה	3	75 - 50 סמ"ק	לוכסמבורג	9D	AFIDOPYRIOPEN	ורסיס ת"פ
1 (3-puree 6-paste)	0.5	0.3	3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	75 סמ"ק	לוכסמבורג	4A	IMIDACLOPRID + GAMMA-CYHALOTHRIN	טוטם שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1						3A		
0.2 (Import tolerance)	0.5	0.5	0.5	ארה"ב	הדברת בוגרי כנימת עש הטבק, למניעת העברת וירוס צהבון האמיר	14	0.15%	לוכסמבורג	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ
								אדמה מכתשים			סימפטר ת"מ
								רימי			סיפרין 20 ת"מ
								תרסיס			תרסיפ ת"מ
								אדמה מכתשים			סימבוש ת"מ
								רימי			סיפרין 10 ת"מ
0.3	0.3	0.3	0.2		למניעת וירוס צהבון האמיר	7	0.15%	לוכסמבורג	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ
2.5	2	1	0.05		עד 2 יישומים בעונה	3	50 סמ"ק	לידור	23	SPIROTETRAMAT	מובנטו 100 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	500 סמ"ק	לוכסמבורג	לא ידוע	SYNTHETIC TERPENES EXTRACT OF CHENOPODIUM	מטרונום פריים רקויאם פריים
0.2 (0.4-paste)	0.5	0.5	0.2			7	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A	ACETAMIPRID	מוספילן לרסוס ת"נ
								כ.צ.ט.			מוסקיטון ת"נ
								תפוזל			מפיסטו ת"נ
2	1	1	0.2		עד 2 יישומים בעונה במרווח 7 ימים לפחות	3	75 סמ"ק	אדמה אגן	28 משרה עמידות	CYANTRANILIPROLE + ACIBENZOLAR-S-METHYL	מינקטו אלפא ת"ר
1 (3-paste)	0.3	0.3	0.05								
פטור	1	1	פטור		יש לרסס בשעות הערב	3	0.1%	אדמה מכתשים דע-קדם	לא ידוע	AZADIRACTIN	נימיקס 45 ת"מ עזגן א"ר
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	דע-קדם	לא ידוע	NEEM OIL + PYRETHRINS	נימפר ת"מ
פטור	1	1	פטור						3A		

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Bemisia tabaci</i> כנימת עש הטבק											
1.5	0.7 (DFA-0.15)	0.7 (DFA-0.4)	0.3 (DFA-0.02)			3	75 סמ"ק	לידור	4D	FLUPYRADIFURONE	סיבנטו פריים ת"י
1 (3-puree, 6-paste)	0.5	0.3	3	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	היישום בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה, לא יותר משני טיפולים בעונה	3	100 סמ"ק	דור.קי	4A	IMIDACLOPRID	סייפן ת"י
								תפוזל			קודקוד ת"י
								אדמה מכתשים			קוהינור 350 ת"י
								לידור			קונפידור ת"י
								תרסיס		קונפידנס ת"י	
1	0.01*	0.01*	1	א. אירופי, אנגליה.	הטיפול מידי 3-4 ימים, למניעת וירוס צהבון האמיר	3	0.3%	אדמה אגן	3A	FENPROPATHRIN	סמש ת"י
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1% - 0.5%	לוכסמבורג	לא נקבע	FATTY ACID POTASSIUM SALT	פליפר ת"י
<i>Spodoptera exiqua</i> לפיגמה											
0.5	0.5	0.5 (0.01 מ- 14.8.2024)	0.2	א. אירופי מ- 14.8.2024	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"י
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"י
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפוזל	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"י
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
1	1	1.5	0.2			3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"י
0.02 (0.15-paste)	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"י
	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		14	40 סמ"ק	דור.קי	15	LUFENURON	מאציו 50 ת"י
								כ.צ.ט			מירון 50 ת"י
								אדמה אגן			מץ ת"י
								תפוזל			צבר ת"י
2	2	0.6	0.5			7	75 סמ"ק	תפוזל	18 6	METHOXYFENOZIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"י
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
0.3	0.3	0.3	0.2			7	50 סמ"ק	תרסיס	3A	BIFENTHRIN	סטרטר ת"י
	0.01D	0.01D	פטור				1.5 - 2 ק"י	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"י
							2 - 1.5 ק"י				ספסן 1015 פ"י
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	תרסיס	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורנס 200 ת"י
2	1	*0.01	0.2	א. אירופי		4	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"י

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר		
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל										
מנהרנים <i>Liriomyza</i> spp.													
0.07	0.09	0.015	0.02	א. אירופי	בשילוב עם שמן.	3	60 סמ"ק	6	ABAMECTIN		אגרירון ת"מ		
											אקרימקטין ת"מ		
											ביומקטין ת"מ		
											ורטיגו ת"מ		
											ורטימק ת"מ		
ורקוטל ת"מ													
			0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	70 - 100 גרם	גדות אגרו	14	THIOCYCLAM	אויסקט-S א"מ		
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה	מומלץ לשלב עם מטרונום פריים 0.5%	3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר		
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1										
1	0.6	*0.01	0.5	א. אירופי		3	25 גרם	תרסיס	17	CYROMAZINE	טופגארד א"ר		
								תפוזל			טרופר א"ר		
								אדמה מכתשים			טריגרד 75 א"ר		
0.4	0.7	0.7	0.05		בתוספת שמן וירותר 1%	3	80 סמ"ק	אגריכס	5	SPINOSAD	טרייסר אולטרה		
	0.02*	0.02*	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב שמן EOS 1%	3	0.1%	אדמה אגן	6	MILBEMECTIN	מילבנוק ת"מ		
נמטודות יוצרות עפצים <i>Meloidogyne</i> spp.													
	פטור	פטור	פטור	א. אירופי מ- 11.5.2024	היישום באמצעות מערכת הטפטוף או בהגמעה, על-פי הוראות השימוש המפורטות בתוויות	3	400 סמ"ק	ביו-יום	לא ידוע	GARLIC EXTRACT	ביוגארד 100 ת"נ		
1	0.9	0.5	0.35			3	130 סמ"ק	לידור	C2	FLUOPYRAM	וולום פריים 400 ת"ר		
2	0.01*	0.01 0.002 (11.5.2024 מ-)	0.01			21	0.5 ליטר	תרסיס	1A	OXAMYL	1A	OXAMYL	ויוה ת"נ
							1 ליטר	גדות אגרו					ויידט 10 ת"נ
0.07	0.09	0.015	0.02			א. אירופי		3	600 סמ"ק	אדמה אגן	6	ABAMECTIN	טרוויגו ת"ר
								3	250 סמ"ק	תפוזל			נמטוקס ת"ר
			פטור					3	1000 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא ידוע	CARVACROL	נמקיל תח'
0.7 (1.5-paste)	0.01D	0.01D	0.3	א. אירופי, אנגליה		75	800 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא מסווג	FLUENSULFONE	נימיץ ת"מ		
עש הפקעות (<i>Phthorimaea perculella</i>) (עשבחנין הבולבוסים)													
0.5	0.5	0.5 (0.01 מ- 14.8.2024)	0.2	א. אירופי מ- 14.8.2024	מוגבל ל 2 רסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ		
0.3	0.3	0.3	0.2			7	75 סמ"ק	לוכסמבורג	3A	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ		
								תרסיס			סטרטר ת"מ		
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	כ.צ.ט	15	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר		
								תפוזל			שונית ת"ר		
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אדמה אגן	6	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקליים ת"מ		
								תפוזל			פרפקט ת"מ		

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Autographa gamma</i> פלוסיה											
0.5	0.5	0.5 (0.01 מ-14.8.2024)	0.2	א. אירופי מ-14.8.2024	מוגבל ל- 2 ריסוסים עוקבים.	7	30 - 45 סמ"ק	גדות אגרו	22A	INDOXACARB	אוואנט ת"מ
	0.01D	0.01D	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		15	75 - 100 סמ"ק	לוכסמבורג	15	CHLORFLUAZURON	אטברון ת"מ
0.3	0.3	0.3	0.2			7	50 סמ"ק	תפוזל	3A	BIFENTHRIN	אטלס ת"מ
								לוכסמבורג			טלסטאר ת"מ
								תרסיס			סטרטר ת"מ
0.6 (1.2-paste)	0.6	0.7	0.3			3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	22B	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05	א. אירופי, אנגליה		3	20 סמ"ק	אדמה מכתשים	28 3A	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר
0.1 (6-dry or wet pomace)	0.07	0.07	0.1								
1	1	1.5	0.2			3	20 - 30 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	250 סמ"ק	ביו דליה	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	ביו טי פלוס ת"ר
								75 גרם			דלפין ג"ר
								50 - 100 גרם			פרוביט ג"ר
0.25 (0.8-paste)	0.2	0.2	0.02		עד 2 ריסוסים בעונה	3	30 סמ"ק	אדמה אגן	4A 28	THIAMETHOXAM + CHLORANTRANILIPROLE	דוריבו ת"ר
1.4	0.6	0.6	0.05								
0.02 (0.15-paste)	0.4	0.4	0.2	ארה"ב		3	10 גרם	אדמה מכתשים	15 6	LUFENURON + EMAMECTIN BENZOATE	דנים פיט ג"ר
	0.02	0.02	0.01								
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	50 - 100 סמ"ק	גדות אגרו	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
0.6	0.2	2	0.3	אנגליה		5	15 גרם	אדמה מכתשים	28	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	כ.צ.ט	15	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר
								תפוזל			שונית ת"ר
0.4	0.5	0.06	0.01			3	40 סמ"ק	אגריכס	5	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01			7	40 סמ"ק	אגרולב	6	EMAMECTIN BENZOATE	פוקר ת"מ
								אדמה אגן			פרוקליים ת"מ
								תפוזל			פרפקט ת"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.5	0.5 (0.1 מ-10.2024)	0.05	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		14	200 סמ"ק	לידור	4A 3A	THIACLOPRID + DELTA METHRIN	פרותיאוס תש"מ
	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2								
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Spodoptera littoralis</i> פרודניה											
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	תפוזל	15 6	TEFLUBENZURON + EMAMECTIN BENZOATE	אקזיט ת"ר
0.02 (0.15-paste)	0.02	0.02	0.01								
1	1	1.5	0.2		עד שני רסוסים בעונה.	3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	PYRIDALYL	בז ת"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ- 10.2024)	0.2		א. אירופי, אנגליה	14	50 - 100 סמ"ק	גדות אגרו	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
0.2 (import tolerance)	0.5	0.5	0.5		ארה"ב	14	30 - 50 סמ"ק	לוכסמבורג	3A	CYPERMETHRIN	טיטאן 20 ת"מ סיפרין 20 ת"מ תרסיס ת"מ סיפרין 10 ת"מ שרפז ת"מ
								רימי			
								אדמה מכתשים			
								רימי			
							60 - 100 סמ"ק	אדמה מכתשים			
1	0.01*	0.01*	1		א. אירופי, אנגליה	3	200 - 350 סמ"ק	גדות אגרו	1A	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ לאנט 90 א"מ מתומקס 90 א"מ מתוניט 90 א"מ
							50 - 75 גרם	גדות אגרו			
							80 - 100 גרם	אדמה מכתשים			
								תרסיס			
1.5	1.5	1.5	0.5			14	50 סמ"ק	כ.צ.ט. תפוזל	15	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר שונית ת"ר
0.5	0.1	0.1	1		א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	10	100 - 150 סמ"ק	אדמה אגן	3A	ESFENVALERATE	מוסטנג ת"מ
2 0.02 (0.15-paste)	2 0.02	0.6 0.02	0.5 0.01			7	75 סמ"ק	תפוזל	18 6	METHOXYFENOZIDE + EMAMECTIN BENZOATE	מטרופולין ת"ר
	0.4	0.4	0.2		ארה"ב	14	40 סמ"ק	כ.צ.ט.	15	LUFENURON	מירון 50 ת"מ מץ ת"מ צבר ת"מ
								אדמה אגן			
								תפוזל			
1	0.01*	0.01*	1		א. אירופי, אנגליה	3	150 - 200 סמ"ק	אדמה אגן	3A	FENPROPATHRIN	סמש ת"מ
	0.01D	0.01D	פטור			0	1.5 - 2 ק"ג	רימי	לא מסווג	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג ספסן 1015 פ"ג
	0.01D	0.01D	פטור			3	100 - 200 גרם	אדמה מכתשים	11A	<i>Bacillus thuringiensis</i>	פרוביט ג"ר
2	2	0.6	0.5			3	50 - 75 סמ"ק	אגריכס	18	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר
2	1	*0.01	0.2		א. אירופי	4	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	15	NOVALURON	רימון 10 ת"מ
1.4	0.6	0.6	0.05			3	20 סמ"ק	גדות אגרו	28	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
תריפס Thrips											
	0.3	0.3	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 3 יישומים בעונה, לא ברציפות. תוספת סוכר עשויה לשפר את הקטילה.	4	100 גרם	רימי	1A	FORMETANATE HCL	דיקרזול א"מ
0.2 (1-paste, puree)	0.07	0.07 (0.1 מ-10.2024)	0.2	א. אירופי, אנגליה		14	50 - 100 סמ"ק	גדות אגרו	3A	DELTA METHRIN	דסיס ת"מ
0.2 (Import tolerance)	0.5	0.5	0.5	ארה"ב		14	0.15%	תרסיס	3A	CYPERMETHRIN	תרסיפ ת"מ
בוטריטיס (עובש אפור) Botrytis cinerea											
0.5	1	1	1	ארה"ב		3	250 סמ"ק	תפוזל	D1	PYRIMETHANIL	אתוס 300 ת"ר
							0.2%	לידור			מיתוס ת"ר
							200 סמ"ק	כ.צ.ט.			פורטיס ת"ר
							125 סמ"ק	תפוזל			פירוס 400 ת"ר
								אדמה מכתשים			פרדיקט ת"ר
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט.	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05		6	אדמה אגן		C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר	
1.5	1.5	1.5	0.5			3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	D1	CYPRODINIL +	בנלוס ת"מ
1.3	0.9	0.9	0.5						G1	TEBUCONAZOLE	
3	3	3	0.3			6	100 סמ"ק	תפוזל	C2	BOSCALID +	דיסקברי ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2						C3	TRIFLOXYSTROBIN	
5	3	3	0.3	ארה"ב		3	200 סמ"ק	תפוזל	E2	FLUDIOXONIL +	טוויסט ת"ר
0.5	1	1	1						D1	PYRIMETHANIL	
	1	1	0.1	ארה"ב		3	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	A3	THIOPHANATE METHYL	טופז א"ר
	פטור	פטור	פטור			3	200 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
0.5	1	1	1	ארה"ב		3	120 סמ"ק	לידור	D1	PYRIMETHANIL +	לונה טרניקיליטי 500 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35						C2	FLUOPYRAM	
1.5	1.5	1.5	0.5			4	60 סמ"ק	אגריכס	D1	CYPRODINIL +	סוואנה ת"ר
5	3	3	0.3		עד 3 יישומים בעונה		60 גרם	אדמה אגן	E2	FLUDIOXONIL	סוויץ' ג"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	לוכסמבורג	לא מסווג	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר
	3	3	1.8	ארה"ב	עד שני יישומים בעונה	3	100 גרם	אדמה אגן	G3	FENPYRAZAMINE	פרולקטוס ג"ר
0.5	1.5	1.5	0.1			14	125 סמ"ק	גדות אגרו	D1	MEPANIPYRIM	פרופיקה ת"ר
	1.5	1.5	1	ארה"ב	עד 2 יישומים במרווח של 7 ימים	3	100 סמ"ק	לוכסמבורג	C2	ISOFETAMID	קנג'ה ת"ר
3 (3.5-paste)	2	2	0.15		2 יישומים במרווח של 7 ימים	6	100 סמ"ק	רימי	C2	PENTHIOPYRAD	שידו ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Alternaria spp. / Stemphylium botryosum</i> חלפת / סטמפיליום											
2.5 (Mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 - 300 גרם	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול אייר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפולי מניעה במרווח של 7-10 ימים. ניתן לשלב עם cymoxanil להדברת מחלה קיימת	3	200 סמ"ק	אדמה אגן	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	בראבו 720 ת"ר
								תרסיס			ברבי 720 ת"ר
						3	300 סמ"ק	תפוזל			ברק ת"ר
								גדות אגרו		נוגל ת"ר	
0.6	2	2	0.3			7	50 סמ"ק	כ.צ.ט.	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגרון ת"מ
								תרסיס			סקוטר ת"מ
								אדמה אגן			סקור ת"מ
								תפוזל			סקיפר ת"מ
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	המירווח בין הרסוסים 7 ימים.	5	350 גרם	רב אתרי לא ידוע	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס אייר	
0.2	0.4	0.4	0.2							גדות אגרו	מנקור אייר
								תרסיס		צימוקלין אייר	
1.3	0.9	0.9	0.5			21	75 סמ"ק	גדות אגרו	G1	TEBUCONAZOLE	טבוקול ת"מ
								לידור			פוליקור ת"מ
								כ.צ.ט.			פולירון ת"מ
	פטור	פטור	פטור			3	200 - 300 סמק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 4 יישומים בעונה	5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג"ר
								לוכסמבורג			מנקוזן אייר
								גדות אגרו			מנקוטל אייר
								אגריכס			סנקוזב אייר
								אגריכס			סנקוזב ג"ר
2.5 (Mancozeb)	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	250 גרם	אדמה אגן	רב אתרי	METIRAM	פולירם DF ג"ר
0.6	2	2	0.3	א. אירופי, אנגליה		7	75 סמ"ק	תפוזל	G1	DIFENOCONAZOLE +	פטרווט ת"ר
1.7	0.02*	0.02*	0.03								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Phytophthora infestans</i> כימסון											
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	טיפולי מניעה במרווח של 7-10 ימים. בשילוב עם ויטן	3	180 גרם	אדמה מכתשים	רב אתרי	CHLOROTHALONIL	אודאון ג"ר
					ניתן לשלב עם סיימוקס ו/או דיימונד להדברת מחלה קיימת.			אדמה אגן			בראבו 720 ת"ר
								תרסיס			ברבי 720 ת"ר
								תפוזל			ברק ת"ר
1.5	2	2	0.02			4	100 סמ"ק	אדמה אגן	C8 H5	AMETOCTRADIN + DIMETHOMORPH	אורבגו ת"ר
1.5	1	1	0.5								
2.5 (Mancozeb)	2	*0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	250 - 300 סמ"ק	לידור	רב אתרי	PROPINEB	אנטרקול א"ר
1.5	1	1	0.5		בשילוב דרגופיקס	7	50 גרם	גדות אגרו	H5	DIMETHOMORPH	אצן ג"ר
					בשילוב עם צימוקלין			תרסיס			אתלט ג"ר
					בשילוב ויטן או קורזייט ומנצידן			תפוזל			דיימונד ת"ר
					בשילוב צימוקלין/מנקור			אדמה מכתשים			ספינקס ת"ר
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	בשילוב עם רידומיל גולד MZ, ניתן לשילוב גם עם ויטן	3	225 גרם	כ.צ.ט	רב אתרי H5	MANCOZEB + DIMETHOMORPH	אקרובט 69 ג"ר
1.5	1	1	0.5								
1.5	1	1	0.5			3	100 גרם	אדמה מכתשים	H5 C5	DIMETHOMORPH + FLUAZINAM	באנג'ו פורטה ת"ר
1.5	0.3	0.3	0.01								
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	המינון הנמוך, בשילוב עם סיימואX	7	250 - 350 סמ"ק	תפוזל	רב אתרי H5	CHLOROTHALONIL + DIMETHOMORPH	ברקוד ת"ר
1.5	1	1	0.5					אדמה מכתשים			ספינקס סופרה ג"ר
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		7	300 גרם	לוכסמבורג	רב אתרי A1	MANCOZEB + BENALAXYL	גלבן מנקוזב א"ר
0.2	0.5	0.3	0.3								
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		5	300 גרם	אדמה מכתשים	רב אתרי A1	MANCOZEB + METALAXYL	דו רה מי א"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5					גדות אגרו			מנקולקסיל א"ר
4 (5-paste)	4	4	0.2		יש לשלב עם תכשיר נוסף במפורט בתוית	3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	F4	PROPAMOCARB HCl	דותן-פרופלנט ת"ר
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	המינון בין הרסוסים 7 ימים.	5	350 גרם	גדות אגרו	רב אתרי לא ידוע	MANCOZEB + CYMOXANIL	דרגופיקס א"ר
					בשילוב עם אתלט			גדות אגרו			מנקור א"ר
								תרסיס			צימוקלין א"ר
								אדמה מכתשים			סימוקס-טופ א"ר
0.45	0.3	0.3	0.05			7	40 סמ"ק	אגריכס	H5 F9	BENTHIAVALICARB + OXATHIPIPROLIN	זורבק אנדויה תש"מ
0.5 (3-dried)	0.2	0.4	0.1								
1	2	2	1			7	50 סמ"ק	גדות אגרו	C3 F9	FAMOxadONE + OXATHIPIPROLIN	זורבק אנקנטיה ר"ת
0.5 (3-dried)	0.2	0.4	0.1								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Phytophthora infestans</i> כימסון											
0.2	0.4	0.4	0.2		המינון וימי ההמתנה, בהתאם לתכשיר המשולב, ראה בתוית	3	70-125 גרם	לוכסמבורג	לא ידוע	CYMOXANIL	ויטן ג'יר
0.2	0.4	0.4	0.2			5	100 גרם	תרסיס			סימון ג'יר
						3	70 - 110 גרם	תפוזל			סימוקס X ג'יר
								גדות אגרו			סימוקסן 60 ג'יר
						ראה בתוית	60 - 80 גרם	גדות אגרו			קורזייט 60 ג'יר
3	60 גרם	כ.צ.ט	סיני ג'יר								
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה		3	300 סמ"ק	גדות אגרו	רב אתרי לא ידוע	CHLOROTHALONIL + CYMOXANIL	זטניל C ת"ר
0.2	0.4	0.4	0.2								
	פטור	פטור	פטור			3	200 - 300 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 4 יישומים בעונה	5	250 גרם	גדות אגרו	רב אתרי	MANCOZEB	טרידקס גרגרי
								לוכסמבורג			מנקו די ג'יר
								לוכסמבורג			מנקוזן א"ר
								גדות אגרו			מנקוטל א"ר
								אגריכם			סנקוזב ג'יר
								אדמה מכתשים			מנצידן 80 אינדופיל
								אדמה מכתשים			מנצידן 75 אינדופיל
								אגריכם			סנקוזב א"ר
פטור	5	5	פטור		יש לדאוג לכיסוי מלא של הצמחים	7	300 סמ"ק	תפוזל	רב אתרי	TRIBASIC COPPER SULFATE	טריו ת"ר
								אדמה אגן			נחושתן ת"ר
								רימי			מרק בורדו אולטרא
פטור	5	5	פטור			7	300 סמ"ק	אדמה מכתשים	רב אתרי	COPPER SULFATE PENTAHYDRATE	מאסטרקופ ת"ר
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה	עד 4 יישומים בעונה	14	250 סמ"ק	תפוזל	רב אתרי	CHLOROTHALONIL + METALAXYL-M	מטאל גולד ת"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5					אדמה אגן			A1
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	150 סמ"ק	אדמה אגן	רב אתרי	CHLOROTHALONIL + AZOXYSTROBIN	קומודור ת"ר
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5								
פטור	100	100	פטור	א. אירופי, אנגליה	יישום יחיד בשנה	3	400 סמ"ק	לוכסמבורג	משרה עמידות רב אתרי	POTASSIUM PHOSPHITE + CHLOROTHALONIL	קוסמוס ת"ר
5	0.01*	0.01*	5								
0.2	0.4	0.4	0.2			3	60 סמ"ק	אדמה מכתשים	לא ידוע	CYMOXANIL + MANDIPROPAMID	קריאל פלוס ג'יר
1	3	3	0.3								

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
המשך: כימסון <i>Phytophthora infestans</i>											
פטור	5	5	פטור		עד 2 ריסוסים בעונה	7	100 - 200 גרם	תפוזל	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	בלוז ת"ר
								גדות אגרו			קוצייד 2000 ג"ר
								אגרולב			קופרסייד ג"ר
								ביו-יום			קופרפורס ת"ר
1	3	3	0.3		בשילוב רידומיל גולד MZ או קורזייט או ויטן	3	60 סמק	אדמה אגן	H5	MANDIPROPAMID	רבוס 250 ת"ר
2.5	3	3	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	אין לרסס יותר מ-2-3 פעמים בעונה.	5	300 גרם	תרסיס	רב אתרי	MANCOZEB + METALAXYL-M	רודאו MZ ג"ר
1 (3-paste, puree)	0.3	0.3	0.5					אדמה אגן			A1
ניקוד בקטרי <i>Pseudomonas syringae</i>											
פטור	5	5	פטור			7	0.3 - 0.5%	גדות אגרו	רב אתרי	COPPER HYDROXIDE	בלו שילד א"ר
								גדות אגרו			פרסול ג"ר
								רימי			פונגורן א"ר
								גדות אגרו			קוצייד 2000 ג"ר
פטור	100	100	פטור			7	0.4%	לוכסמבורג	משרה עמידות רב אתרי	POTASSIUM PHOSPHITE + COPPER OXYCHLORIDE	הרקולס ת"ר
פטור	5	5	פטור			7	200 גרם	אדמה אגן	רב אתרי	COPPER OXYCHLORIDE + COPPER HYDROXIDE	סופרקופ ג"ר
פטור	5	5	פטור			3	300 גרם	לידור	רב אתרי	COPPER OXYCHLORIDE + PROPINEB	קופרו אנטרקול א"ר
2.5 (Mancozeb)	2	0.05	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב							
עובש עלים <i>Fulvia fulva</i>											
1.3	0.9	0.9	0.5			21	75 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	TEBUCONAZOLE	אוריוס 25 ת"ש
								גדות אגרו			טבוקול ת"מ
								לידור			פוליקור ת"מ
								כ.צ.ט.			פולירון ת"מ
0.6	2	2	0.3			7	100 סמ"ק	כ.צ.ט.	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ
								אדמה אגן			סקוטר ת"מ
								תרסיס			סקור ת"מ
								תפוזל			סקיפר ת"מ
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט.	C2	BOSCALID +	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05		6	אדמה אגן		C3	PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר	

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Fulvia fulva</i> עובש עלים המשך:											
0.3	0.1	0.15	0.05			3	0.1%	לוכסמבורג	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ
3	3	3	0.3			6	100 סמ"ק	תפוזל	C2 C3	BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN	דיסקברי ת"ר
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב	אין לרסס עד 21 ימים משתילה.	10	50 סמ"ק	תפוזל	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר
								אדמה מכתשים			מירדור ת"ר
								אדמה מכתשים			עמיסטר ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2		רצוי לבצע ריסוסים מניעה כשאין נגיעות.	3	20 גרם	לידור	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פלינט ג"ר
3	3	3	0.3	קנדה, ארה"ב		10	200 סמ"ק	תפוזל	C2	BOSCALID + AZOXYSTROBIN	פרימיום ת"ר
0.2	3	3	0.5						C3		
<i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i> קימחונית / קימחון											
1.7	0.02*	0.02*	0.03	א. אירופי, אנגליה		7	30 - 40 סמ"ק	אגריכס	E1	QUINOXYFEN	אביר ת"ר
	0.1	0.1	0.2	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	PENCONAZOLE	אופיר 2000 ת"ש
								כ.צ.ט.			אורון ת"מ
								100 סמ"ק			טופנקו 100 ת"מ
1.3	0.9	0.9	0.5		עד 2 יישומים בעונה ולא ברציפות	21	75 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	TEBUCONAZOLE	עומר ת"מ
								גדות אגרו			אוריוס 25 ת"ש
								לידור			טבוקול ת"מ
								כ.צ.ט.			פוליקור ת"מ
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב	ריסוס אחד בעונה	10	0.06%	אדמה אגן	C3	AZOXYSTROBIN + TETRACONAZOLE	אמרלד אנרגי ת"ר
0.3	0.1	0.15	0.05						G1		
	0.05*	0.01 0.05 (מ-3.25)	0.05	א. אירופי מ-3.2025 (מועד משוער), ארה"ב.	יישום יחיד בעונה	3	40 סמ"ק	אדמה אגן	G1	CYPROCONAZOLE	אטמי אקסטרה ת"י
								תרסיס			סיפרו ת"י
								תפוזל			צפיר ת"י
	0.3	*0.01	0.5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	75 סמ"ק	לידור	G1	TRIADIMENOL	באיפידן ת"מ
								אדמה מכתשים			שביט ת"מ
0.6	2	2	0.3			7	100 סמ"ק	כ.צ.ט.	G1	DIFENOCONAZOLE	בוגירון ת"מ
								תרסיס			סקוטר ת"מ
								אדמה אגן			סקור ת"מ
								תפוזל			סקיפר ת"מ

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i> קימחונית / קימחון											
3	3	3	0.3		למניעת עמידות - 3 ריסוסים לעונה לא ברציפות	3	75 גרם	כ.צ.ט	C2	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	בליס ג"ר
1.4	0.3	0.3	0.05			6		אדמה אגן	C3		סיגנום ג"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	לוכסמבורג	רב אתרי	SULFUR	גופרית ת"ר
								0.4% - 0.8%			סולפרון גרגרי
								0.4%			גפרביק 70 אב'
								3 - 4 ק"ג			גפרכל א"ר
								0.75%			הליוגופרית ת"ר
											מיקרוטיול ג"ר
											סולי ג"ר
											סולפו-לי ת"ר
											סופה ת"ר
											סוליסט ג"ר
	סולפוזול ג"ר										
	קומולוס ג"ר										
	תיוביט ג"ר										
			פטור		בתוספת משטח אגוז 0.4%	3	1%	דע-קדם	לא ידוע	CANOLA OIL + NEEM OIL	גניקן ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור					לא ידוע			
0.3	0.1	0.15	0.05			3	60 - 75 סמ"ק	לוכסמבורג	G1	TETRACONAZOLE	דומארק ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			7	400 סמ"ק	לוכסמבורג	רב אתרי G1	SULFUR + TETRACONAZOLE	דומארק קומבי א"ר
0.3	0.1	0.15	0.05			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	PARAFFINIC OIL	דימול, שמן
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	PARAFFINIC OIL	דימול, שמן
3	3	3	0.3			6	100 סמ"ק	תפזול	C2 C3	BOSCALID + TRIFLOXYSTROBIN	דיסקברי ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2			3	150 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס אקט ת"מ
	פטור	פטור	פטור			3	150-300 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL	טימורקס גולד ת"מ
0.9	0.6	0.6	0.2			6	30 סמ"ק	כ.צ.ט	B6	METRAFENONE	ויוואנדו 500 ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	דע-קדם	לא נקבע	HYDROGEN PEROXIDE	כיפת ברזל ת"נ
1.3	0.9	0.9	0.5			3	50 סמ"ק	לידור	G1 C2	TEBUCONAZOLE + FLUOPYRAM	לונה אקספריאנס 400 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35			3	50 סמ"ק	לידור	G1 C2	TEBUCONAZOLE + FLUOPYRAM	לונה אקספריאנס 400 ת"ר
0.5	0.7	0.7	0.2			3	40 סמ"ק	לידור	C3 C2	TRIFLOXYSTROBIN + FLUOPYRAM	לונה סנסיישן 500 ת"ר
1	0.9	0.5	0.35			3	40 סמ"ק	לידור	C3 C2	TRIFLOXYSTROBIN + FLUOPYRAM	לונה סנסיישן 500 ת"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר					
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל													
<i>Oidiopsis sicula / Oidium neolycopersici</i> קימחונית / קימחון																
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	ארה"ב	יישום בריסוס. אין לרסס עד 21 יום משתילה.	10	50 סמ"ק	תפוזל	C3	AZOXYSTROBIN	זאוס ת"ר					
						15					טופסטאר ת"ר					
						10					אדמה מכתשים	מירדור ת"ר				
											אדמה מכתשים	עמיסטר ת"ר				
						7					150 סמ"ק	בהגמעה. 2 יישומים בעונה בהפרש של חודש. טיפול ראשון חודש משתילה.	תפוזל	C3	AZOXYSTROBIN	עמיעוז ת"ר
													אדמה מכתשים			זאוס ת"ר
													אדמה מכתשים			מירדור ת"ר
													גדות אגרו			עמיסטר ת"ר
פטור	פטור	פטור	פטור		1 ק"ג ל-100 ליטר מים.	7	1%	דע-קדם	לא נקבע רב אתרי	POTASSIUM HYDROGEN CARBONATE + COPPER SULPHATE	מור א"מ					
פטור	5	5	פטור			3	1%	אדמה מכתשים	לא ידוע	NEEM OIL	נימגארד שמן					
0.2	0.04	0.04	0.05	א. אירופי, אנגליה	למניעת תנגודת יש לשלב שביט במינון המורשה בגידול.	3	20 סמ"ק	אדמה אגן	לא ידוע	CYFLUFENAMID	נץ ת"ש					
0.3 (0.5-puree, 1-paste)	0.3	0.6	0.3			7	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	G1	MYCLOBUTANIL	סיסטאן 24 ת"מ					
							60 סמ"ק				אגריכס	ראלי ת"ש				
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.5%	לוכסמבורג	רב אתרי	<i>Bacillus subtilis</i>	סרנייד ASO ת"ר					
	0.01D	0.01D	פטור		בהיעדר נתוני דעיכה לא ניתן לקבוע התאמה ליעדי יצוא	3	15 - 25 גרם	גדות אגרו	H4	POLYOXINS	פולאר ג"מ					
0.6	2	2	0.3	א. אירופי, אנגליה		7	75 סמ"ק	תפוזל	G1 E1	DIFENOCONAZOLE + QUINOXYFEN	פטרויט ת"ר					
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5	א. אירופי מ- 3.2025 (מועד משוער), ארה"ב	בהגמעה, עד 2 יישומים בעונה. הנחיות נוספות ראה בתווית	3	100 סמ"ק	אדמה מכתשים	C3	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	פריורי אקסטרה ת"ר					
			0.05* 0.05 (3.25 מ-ת)						G1							
3	3	3	0.3	קנדה, ארה"ב		10	200 סמ"ק	תפוזל	C2 C3	BOSCALID + AZOXYSTROBIN	פרימיום ת"ר					
0.2	3	3	0.5													
0.5	0.7	0.7	0.2		רצוי לבצע ריסוסי מניעה כשאין נגיעות.	3	0.02%	תפוזל	C3	TRIFLOXYSTROBIN	פאנטום ת"ר					
								לידור								
0.2	0.01*	0.01*	0.8	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב	עד 2 יישומים בעונה	3	30 סמ"ק	לוכסמבורג	B6	PYRIFENONE	קאסורי ת"ר					
5	0.01*	0.01*	5	א. אירופי, אנגליה, ארה"ב		3	150 סמ"ק	תרסיס	רב אתרי C3	CHLOROTHALONIL + AZOXYSTROBIN	קולונל ת"ר					
0.2 (0.6-paste)	3	3	0.5					אדמה אגן			קומודור ת"ר					
פטור	פטור	פטור	פטור			3	0.1%	גדות אגרו	לא נקבע	POTASSIUM BICARBONATE	קליגרין א"מ					
	פטור	פטור	פטור			4	50 סמ"ק	סטוקטון	לא ידוע	TEA TREE OIL + DIFENOCONAZOLE	רגב ת"מ					
0.6	2	2	0.3						G1							

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
<u>Soil sterilization</u> חיטוי קרקע											
			0.01		יישום 14-30 יום לפני השתילה. להדברת נמטודות יוצרות עפצים. יישום ע"י מי שעבר השתלמות ייעודית.	ראה הערה	20 - 15 ליטר	גדות אגרו אגריכס אגריכס אגרולב		1,3 DICHLOROPROPENE	אגרוצ'לון ת"מ טלון II נ' קונדור ת"מ קונרי ת"מ
			0.05		14-30 יום לפני השתילה, להדברת דוררת, פיתיוס (מקמקת) וקשיון רולפסי. הוראות שימוש מפורטות ראה בתוית	ראה הערה	43 ליטר 36 / 47 ליטר 36 ליטר 40 ליטר	סוילטק אדמה אגן אגרולב גדות אגרו		METAM SODIUM	אדוכס סופר ת"נ אדיגן סופר ת"נ אדירס 510 ת"נ מתמור 510 ת"נ
			פטור		10-14 יום לפני שתילה. להדברת נמק הליבה, קיב חיידיקי וריקבון רך חיידיקי. יישום ע"י קבלן מורשה	ראה הערה	400 - 500 ליטר	דור כימיקלים		FORMALDEHYDE	פור-דור 37 ת"נ
			0.01		14-30 יום לפני השתילה, להדברת נמטודות עפצים ומניעת עשבייה	ראה הערה	60 - 40 ליטר	רימי		DIMETHYL DISULFIDE	פלדין ת"מ
<u>Growth regulation</u> ויסות צמיחה											
					ריסוס תפרחות בלבד, להגברת חנטה ולהגדלת פרי		0.2%	דשנים וחומרים כימיים		BETA NAPHTHOXY ACETIC ACID	חנטאון ת"נ
					ראה הוראות טיפול בתוית.		0.1 - 0.2%	קשת פרימה		NMT	אורסט א"ר
<u>Sun burns</u> מכות שמש											
			פטור			21	4 ק"ג	תפזול		ZINC	ילבין א"ר
			פטור		רסס לפני שלב הבשלת הפרי	3	5%	לוכסמבורג		KAOLIN	סראונד א"ר
			פטור				10 - 15%	קוי		ZINC OXIDE	קול פלנט א"ר

שאריות מרביות מותרות (MRL)				השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	קבוצת פעילות	חומר פעיל	תכשיר
ארה"ב	אנגליה	א. אירופי	ישראל								
				<u>משטחים / חומרי עזר Adjuvants</u>							
			פטור		לשילוב עם ביו-טי פלוס	בהתאם לתכשיר המשולב	0.2%	ביו-יום		TERPENE ALCOHOLS	אטו ת"מ
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	PARAFFINIC OIL	דימול שמן
פטור	פטור	פטור	פטור			3	1%	תרסיס	לא ידוע	SUMMER OIL	וירותר ת"ש
					לשילוב עם טיטוס	בהתאם לתכשיר המשולב	0.05%	גדות אגרו		ALKYL POLYETHOXY ETHANOL FATTY ACIDS ISOPROPANOL	טיבולין ת"נ
			פטור		לשילוב עם ביו-טי פלוס או ביוגארד	בהתאם לתכשיר המשולב	0.07%	ביו-יום		ETHOXYLATED POLYDIMETHYLSILOXAN	מחץ ת"נ
			פטור		לשילוב עם תכ' אבמקטין		0.2% - 0.1%	כ.צ.ט		ALKYL PHENOXY POLYETHYLENE ETHANOL	משטח BB5 ת"נ
פטור	0.01D	0.01D	פטור			3	1%	גדות אגרו	לא ידוע	NEEM OIL	נימטול שמן

קוטלי עשבים מורשים לשימוש בעגבניות לתעשייה: עונת 2024

תכשיר	חומר פעיל	קבוצת פעילות	בעל הרשיון	שלב/גיל גידול	שלב/גיל עשב	מינון/ד' מרוסס או %	הערות	השארית המותרת		
								נמוכה מזו של ישראל	ישראל	א. אירופי
אגיל 100 ת"מ	PROPAQUIZAFOP	1	אדמה מכתשים		א"ה	50 - 150 סמ"ק	דגניים רב שנתיים יטופלו לפני פריחה ע"ג עשביה רעננה	0.01	0.05	0.05
בומבה ת"נ	GLUFOSINATE AMMONIUM	10	גדות אגרו	ק"ש	עד 10 ס"מ	250-1,000 סמ"ק	הכנת שטחים	0.01	0.1	0.1
בסט-ביי ת"נ			תרסיס							
בסטה 15 ת"נ			גדות אגרו							
ברנר ת"נ			אדמה אגן							
גלובוס ת"נ			אדמה אגן							
פאסטר ת"נ	תפזול									
אוקסיגל ת"מ	OXYFLUORFEN	14	תפזול	ק"ש	ק"ה ועד 10 ס"מ	150 - 200 סמ"ק	הכנת שטחים, בשילוב תכ"גלייפוסט. אין לטפל בשדה שישתל לפני 1 באפריל.	0.02	0.01	0.05*
מידע נוסף על התכשירים ניתן לקבל באתר משרד גליגן ת"מ			אגריכס			30 - 50 סמ"ק				
גליל ת"מ			אדמה אגן			200 סמ"ק				
גליל ת"מ			כ.צ.ט							
אוקסיפסט ת"ר	GLYPHOSATE + OXYFLUORFEN	9	אדמה מכתשים	עד שבועיים ק"ש	א"ה, עד 40 ס"מ	200 סמ"ק	הכנת שטחים. אין לרסס בקרקעות חוליות המכילות פחות מ-10% חרסית	0.2	0.1*	0.1*
זומר ת"ר		14	אדמה אגן					0.02	0.05*	0.01
איזיקטול ת"נ	GLYPHOSATE	9	לוכסמבורג	הכנת שטחים	עשבייה קיימת	100-150 סמ"ק	עד שבועיים לפני שתילה. בתוספת משטח.	0.1	0.1*	0.1*
גליפוגן ת"נ			אדמה אגן							
גליפוס ת"נ			לוכסמבורג							
ראונדאפ ת"נ			אדמה אגן							
ראונדאפ מקס			אדמה אגן							
טייפון ת"נ	תפזול									
גלייפון ת"נ	גדות אגרו									
גלנט סופר ת"מ	HALOXYFOP R METHYL	1	אגריכס			35 - 100 סמ"ק		0.02	0.01*	0.01*
דגנול F ת"מ	FLUAZIFOP-P-BUTYL	1	אדמה מכתשים			50 סמ"ק		0.1	0.06	0.06
חץ סופר ת"מ	CLETHODIM	1	אדמה אגן	מעלה אמיתי ראשון	א"ה	100 - 70 סמ"ק	לדגים רב שנתיים. לכתמים הריכוז הוא 1%. פירוט זנים ראה בתווית	0.5	1	1
סלקט סופר ת"מ			לידור							
קולקט ת"מ			תפזול							

תכשיר	חומר פעיל	קבוצת פעילות	בעל הרשיון	שלב/גיל גידול	שלב/גיל עשב	מינון/ד' מרוסס או %	הערות	שאריות מרביות מותרות (MRL)							
								השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל	ישראל	א. אירופי	אנגליה	ארה"ב			
טיטוס ג"ר טיטניום ג"ר קלאודיוס ג"ר	RIMSULFURON	2	גדות אגרו תרסיס גדות אגרו	לאחר קליטת השתילים	א"ה	5 - 10 גרם	בתוספת שטח 90% 0.1% בשילוב טיבולין. ימי המתנה לפני קטיף. 96	0.1	0.01*	0.01*	0.05				
												גדות אגרו	5	METRIBUZIN	כרמל ג"ר פייטון 70 ג"ר מטרו ת"ר
ליאופרד ת"מ	QUIZALOFOP-P-ETHYL	1	אדמה אגן		א"ה, לפני הגעה לפריחה	50-200 סמ"ק		0.1	0.05	0.05					
מוניטור ג"ר	SULFOSULFURON	2	אדמה אגן	משבועיים א"ש	ק"ה/א"ה	5 - 8 גרם	פירוט זנים והוראות שימוש ראה בתווית	0.05	0.01*	0.01*					
סטאר ת"מ רונסטאר ת"מ	OXADIAZON	14	תפזול גדות אגרו	ק"ש	ק"ה/א"ה	350 סמ"ק	לפני ההמטרה הקודמת לשתילה	0.02	0.01*	0.05*					
פוקוס אולטרא ת"מ	CYCLOXYDIM	1	אדמה אגן		א"ה	120 - 400 סמ"ק	ארה"ב	0.2	1.5	1.5					
צילנג'י ת"ר	ACLONIFEN	34	גדות אגרו	ק"ש	ק"ה וא"ה	400 סמ"ק	3 שבועות לפחות לפני השתילה	0.02	0.01*	0.01*					
קדרה ת"נ	IMAZAPIC	2	לכסמבורג	א"ש		2 סמ"ק	להדברת עלקת. יישום ראשון 75 ימים משתילה, יישום שני 96 ימים משתילה. פירוט זנים ראה בתווית	0.1	0.01*	0.01*					