

מדדים לקטיף אבוקדו לשוק המקומי

קביעת מועדי סף לקטיף ומדדי הבשלה נועדו למנוע שיווק פרי לא בשל ובלתי ראוי למאכל הגורם לתדמית שלילית של האבוקדו בעיני הצרכנים מחד, ולנזק רב למגדלים מאידך.

ישנם מספר זנים של אבוקדו בארץ, זנים שמקדימים, זני אמצע עונה וזנים מאחרים להלן הרשימה:

זן אבוקדו	מועד קטיף	מינימום דרגת הבשלה	סימני זיהוי
אטינגר	החל מ 20.9	20.5%	צורה אליפטי צר וקליפה דקה חלקה
ארז	החל מ 15.12 עד פברואר	16%	צורה אגסית קליפה חלקה
ארדיט	מסוף ינואר עד סוף מרץ	20.5%	עגול אליפטי
גליל	החל מ 20.8	18%	צורה מאורכת ומבריקה
האס	מאמצע נובמבר עד אפריל	20.4%	צורה אגסי אליפטי וקליפה מחוספסת עבה וגמישה
הרווסט	מאמצע נובמבר עד אפריל	20%	
וורץ	מסוף ינואר עד סוף מרץ	20.5%	
חורשים	מאמצע נובמבר	22%	
טיג	החל מ 10.8	16%	
לביא	מתחילת דצמבר	20.4%	
ניר/אורית	מאמצע ינואר	21%	
פוארטה	מאמצע נובמבר	22%	צורה אליפטית, קליפה חלקה
פינו	מדצמבר עד פברואר	20.5%	
פינקרטון	החל מ 20.11 עד מרץ	20.5%	צורה אגסית, קליפה בעובי בינוני מחוספס קלות
נאבל	מתחילת מרץ עד מאי	14.3%	צורה עגולה קליפה עבה בגוון ירוק דהוי
ריז	מאמצע מרץ עד אוגוסט	22.1%	צורה עגולה קליפה עבה מחוספסת קלות

מתאריך מועד הקטיף יותר לשווק את האבוקדו לאחר בדיקות מעבדה שיאשרו את דרגת ההבשלה הנדרשת בפרי.

טווח המשקל באבוקדו מינימום 136 גרם לפרי קטן מתחת למשקל זה הפרי אסור לשיווק.


מדדים אלו נקבעו בעבודת שדה ומעבדה ועל בסיס לקחים ותובנות שנצברו במהלך השנים.

פרי אשר יקטף טרם זמנו ולא יעמוד במדדי ההבשלה הנדרשים, יחשב כבוטר ויסולק מהשווקים


תמונות של זני אבוקדו:




סרי אופיני לזן אטינגר




סרי אופיני לזן ארד




סרי אופיני לזן האס







סרי אופיני לזן פינקרטון



גליל





לחץ כאן לקבלת מדדי איכות מפורטים של אבוקדו

<http://news.walla.co.il/item/2997107> קישורים נוספים בנושא