



נקטרינה

דרישות איכות יסודיות

בכפוף להוראות המיוחדות לגבי כל סוג והסבילות המותרת, יתקיימו בנקטרינות

דרישות איכות יסודיות אלה :

- (1) שלמות ;
- (2) ללא מחלות ומזיקים וסימניהם ;
- (3) נקיות וללא סימן נראה לעין של חומר זר ;
- (4) טריות בהופעתן ;
- (5) ללא רטיבות ממקור חיצוני ;
- (6) ללא טעם וריח זרים.

התפתחותן ודרגת הבשלתן של הנקטרינות יהיו כאלה שיבטיחו עמידה בטיפול ובמשלוח והגעה ליעד במצב ובאיכות טובים וכשהם ראויים למאכל.

מתחילת העונה ועד ה- 1.6 הקוטר המזערי של נקטרינה לא יפחת מ-45 מ"מ.
 החל מ- 1.6 הקוטר המזערי של נקטרינה לא יפחת מ- 50 מ"מ.

מדד הבשלה – סוכר :

בזנים המוקדמים רמת סוכר מינימלית 9% בקטיף (עד תאריך 1.6)

בזנים המאחרים רמת סוכר מינימלית 10.5% בקטיף (מתאריך 1.6)

רמת סוכר	תאריך הבשלה	גודל	זני נקטרינה לבנות
9%	אמצע מאי	60-65	גלי שמעוני
9%		65	סאן סנו
9%	סוף מאי	60	ארקטיק סטאר
9%		60	Sweet river
9%		65	רויאל קויין
10.5%	סוף יוני	60	ארקטיק סויט
10.5%	סוף יוני	65	קויין ג'יינט
10.5%	אמצע אוגוסט	65-70	ארקטיק פריז
10.5%	סוף אוגוסט	60	320EE
10.5%	במהלך ספטמבר תחילת אוקטובר	65-70	ארקטיק סנו
10.5%	במהלך ספטמבר תחילת אוקטובר	65-70	ארקטיק מיסט

רמת סוכר	תאריך הבשלה	גודל	זני נקטרינה צהובות
9%	במהלך אפריל תחילת מאי	45-50	אפריל-גלו
9%	תחילת מאי	50-60	רד רובי
9%	אמצע מאי	55-65	רד גלו
9%	במהלך מאי	60-65	רויאל-גלו
10.5%	תחילת יולי		פלברטופ
10.5%	בסוף יולי תחילת אוגוסט		פנטזיה
10.5%	בסוף באוגוסט		פרליין
10.5%	סוף אוגוסט תחילת ספטמבר	65+	Lait Fair

[לחץ כאן לקבלת מדדי איכות מפורטים של נקטרינה](#)